

**УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В МР 3.1.0229-21 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
(COVID-19) (ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ) В СТАЦИОНАРНЫХ
УСЛОВИЯХ"**

Медорганизациям рекомендуют:

- не снижать минимально допустимые комплекты средств защиты;
- определить локальным нормативным актом комплекты для выполнения конкретных видов работ в зависимости от их характера и дополнительных факторов риска. Можно применять СИЗ, которые повышают уровень защиты работников. Это тоже отражают в акте;
- обеспечить контроль за использованием средств защиты и продолжительностью непрерывной работы в них;
- ежедневно регистрировать в журнале вход и выход персонала из "заразной" зоны, использование определенного комплекта СИЗ. Форма журнала произвольная;
- проводить мониторинг и анализ заболеваемости работников, которые надевают разные комплекты СИЗ и, при необходимости, корректировать локальные нормативные акты.

Обновлены некоторые комплекты защитной одежды, которые рекомендуют применять медорганизациям. Так, бригадам неотложной помощи для выезда к лихорадящим больным с признаками ОРВИ достаточно одноразовых медицинских халатов, шапочек, респираторов класса не ниже FFP2 в комплекте с лицевыми щитками, медицинских перчаток и бахил (при входе в помещения). Для выезда к другим пациентам респиратор можно заменить на медицинскую маску, и надеть обычный медицинский халат вместо одноразового.

Сотрудников регистратуры обеспечивают медицинскими халатами и масками, шапочками. Если на посту нет защитного экрана (барьера) еще нужны лицевые щитки. Все эти средства защиты, а также медицинские перчатки должны быть у работников, которые измеряют температуру на входе в поликлинику.

Персонал процедурного, перевязочного, смотрового кабинета для защиты использует шапочки, медицинские халаты, маски и перчатки.

Участковым терапевтам для приема пациентов без лихорадки рекомендуют надевать медицинский халат, шапочку, респиратор класса защиты не ниже FFP2. Узким специалистам (кроме стоматолога, отоларинголога) нужно иметь шапочку, медицинские халаты и маски.

Полный текст документа: **МР 3.1.0252-21. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. Изменения № 1 в МР 3.1.0229-21 "Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (подозрением на заболевание) в стационарных условиях". Методические рекомендации (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 09.07.2021)**